

コロラド州：小麦作柄と気象状況

2003年10月14日

2003年10月12日現在：

この週は比較的暖かな気温が全州を覆ったが、北部及び山岳部では多少の降雪があった。平原部では殆ど降雨がなく、1週間の州平均農作業稼働日数は6.8日であった。

2004年産冬小麦の播種は略終了の段階である。全州の73%の圃場で出芽した。この数値は平年の75%より多少遅れた数値である。一部では乾燥土壌の為出芽が遅れ、又出芽がしても不揃いと報告があった。生育状況は殆どの圃場が“fair to good”と報告された。

土壌水分：

	Very Short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil (%)	35	36	29	0
Subsoil (%)	40	33	27	0

小麦進捗状況：

	2002 Crop	2002 Crop	2001 Crop
Seeded (%)	98	95	95
Emerged (%)	73	71	75

冬小麦作柄状況：

	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Condition (%)	3	20	33	38	6

2002年産及び2003年産収穫面積及び生産量は次の通りである。

	収穫面積 acres	単位収量 bushels	収穫面積 acres
2002年産冬小麦	1,650,000	22.0	36,300,000
2003年産冬小麦*	2,200,000	35.0	7,700,000

*2003年8月1日 USDA 予想。

当該作柄レポートに関するご質問等は下記までにお問い合わせ致します。

小川正晃 : Email ogawa.max@omicnet.com